

NOTE IX.

NOVA SPECIES CUCUJIDARUM.

AUCTORE

J. R. H. NEERVOORT van de POLL.

Inopeplus Olliffi, v. d. Poll.

Nitidissimus, aterrimus, mandibulis palpisque rufotestaceis, labro, antenmarum articulis duobus basalius, tarsisque dilute testaceis; elytra abdominis segmenta quatuor ultima haua obtegentia. — Long. 4 mm.

Caput latum, juxta oculos impressione profunda instratum, commati transverse posito simili (•) grosse et sat dense punctatum. Thorax latus brevisque, capite haud latior; lateribus anguste marginatis, antice rotundatis, basim versus valde angustatis et paulisper emarginatis; angulis anticis prominulis, posticis dentiformibus prominentibus; basi late bilobata; evidenter sed sparse punctatus. Elytra longitudine aequa capiti prothoracique conjunctis, thorace latiora, apicem versus ampliata, punctis aliquot, fere haud conspicuis, irregulariter instructa. Abdomen elytrorum longitudine, paulo angustius, postice rotundato-angustum; segmento ultimo confertim, ceteris tribus segmentis obsolete punctatis.

Haec species mihi videtur *I. terminato* C. Waterh. affinis.

Habitat Queensland bor.

Entomologo doctissimo Siduey Olliff, auctori Revisionis Cucujidarum Australiensium hanc speciem dedicavi.